



ANNEX IV

Protocol d'actuació davant d'una anafilaxi en centres educatius



PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT UNA ANAFILAXI EN CENTRES EDUCATIS



1r PAS: AVALUAR

Afecta 1 òrgan tot sol de forma lleu		VIGILAU	» Borradura o favasses, envermelliment, picor a la boca o als llavis.
			» Inflor de: llavis, parpelles, mans o d'una altra part del cos.
			» Dolor abdominal, nàusees, vòmits o diarrees.
			» Picor d'ulls o de nas, esternuts freqüents, mucositat abundant, ulls vermells o llagimeig.
Afecta 2 o més de 2 òrgans o 1 òrgan de forma greu		EMERGÈNCIA	» Opressió a la gargamella, veu ronca o afònica, respiració sorollosa. Sospitar Anafilaxi
			» Respiració dificultosa, veu entretallada, tos seca repetitiva, ofec, xiulets, pell o llavis blaus. Sospitar Anafilaxi
			» Pal·lidesa, pols dèbil, pèrdua de coneixement, mareig, sensació de mort imminent. Sospitar Anafilaxi

2n PAS: SI SOSPITAU D'ANAFILAXI, AVISAU EL 061 I SEGUIU INSTRUCCIONS

1. NO DEIXEU MAI EL NIN/L'ADOLESCENT TOT SOL. Aviseu perquè una altra persona vagi a buscar l'adrenalina.
2. Telefonau al SAMU 061 (tel. 061) i comunicau que sospita una anafilaxi. Segueixi les instruccions del 061.
3. No dubteu d'administrar-li l'adrenalina (deure de socors) seguint les instruccions del SAMU 061.
4. Crideu els pares o els tutors legals quan pugueu.

Autoinjector tipus ploma	Autoinjector amb botó
1. Agafau la ploma autoinjectable d'adrenalina amb la mà dominant (la que empra per escriure), amb el dit gros al costat del tap de seguretat. 2. Amb l'altra mà llevau el tap de seguretat (groc o blau segons l'adrenalina). 3. Col·locau l'extrem negre o taronja de l'injector a la part externa de la cuixa i subjectau-lo en angle recte. 4. Pressionau l'extrem negre o taronja de l'injector enèrgicament fins que sentiu el clic que confirma que ha començat la injecció. Manteniu-lo pressionat 10 segons. 5. Feis un massatge a la zona d'injecció durant 10 segons.	1. Traieu el protector de l'agulla negra tirant fort en la direcció de la fletxa. Això també retira una funda de seguretat de l'agulla, grisa. 2. Traieu la tapa grisa de seguretat del botó injector vermell. 3. Recolzeu l'extrem obert contra la part externa de la cuixa. Premeu el botó injector vermell fins que se senti un clic. Mantingueu-lo pressionat 10 segons. 4. Feis un massatge a la zona d'injecció durant 10 segons. 5. Per cobrir l'agulla, doneu la volta al protector negre de l'agulla i pressioneu l'extrem ample contra l'extrem obert de l'autoinjector.

Lloc on es troba l'adrenalina.....