



HERPES ZÒSTER

Definició de cas

Criteri clínic

Almenys un dels següents:

- Inici agut d'erupció cutània maculo-pàpol-vesicular habitualment unilateral i localitzada, que afecta un o dos dermatomes, acompanyada o no de dolor a la zona afectada (herpes localitzat)
- Inici agut d'erupció cutània en 3 o més dermatomes contigus, més de 20 lesions fora del dermatoma inicial afectat o afectació sistèmica (herpes disseminat)

Criteri de laboratori

Almenys un dels següents :

- Aïllament del VVZ en cultius de línies cel·lulars
- Detecció d'ADN del VVZ mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR)
- Detecció d'antigen viral per Immunofluorescència directa (IFD), utilitzant anticossos monoclonals específics

Els mètodes serològics tenen una utilitat molt limitada per confirmar l'HZ. Els assaigs d'avidesa d'IgG permeten distingir la infecció primària (baixa avidesa d'IgG) d'una reactivació/reinfecció (alta avidesa d'IgG).

Criteri epidemiològic

No procedeix

Classificació dels casos

Cas sospitós: persona que presenta el **criteri clínic**.

Cas probable: no procedeix.

Cas confirmat: persona que presenta el **criteri clínic** i el de **laboratori**.

Definició de brot: no procedeix.