



TRIQUINOSI

Definició de cas

Criteri clínic	Almenys tres de les següents: – Febre – Miàlgies – Diarrea – Edema facial – Eosinofília – Hemorràgies subconjuntivals, subungueals i retinianes
Criteri de laboratori	Almenys un dels següents: – Confirmació de larves de <i>Trichinella</i> spp. en el teixit muscular obtingut per biòpsia – Resposta específica d'anticossos davant de <i>Trichinella</i> spp. (IFA, ELISA o immunoelectrotransferència Western Blot) La seroconversió (aparició o augment del títol d'anticossos en un segon sèrum obtingut almenys 15 dies (2 setmanes) després de la data de presa de mostra de la primera anàlisi serològica) confirma el diagnòstic. Davant una única determinació serològica, un resultat positiu, per ELISA o IFA, en absència de criteris clínics o epidemiològics, requerirà la confirmació mitjançant una tècnica serològica més específica (Western Blot)
Criteri epidemiològic	Almenys una de les relacions epidemiològiques següents: – Exposició a una font comuna – Exposició a carn contaminada

Classificació dels casos

- **Cas sospitos:** no procedeix.
- **Cas probable:** persona que presenta el **criteri clínic** i l'**epidemiològic**.
- **Cas confirmat:** persona que presenta el **criteri de laboratori**.

Definició de brot

L'aparició de 2 o més casos amb relació epidemiològica.