



HERPES ZOSTER

Definición de caso

Criterio clínico

Al menos una de los siguientes:

- Inicio agudo de erupción cutánea maculo-pápulo-vesicular habitualmente unilateral y localizada, que afecta a uno o dos dermatomas, acompañada o no de dolor en la zona afectada (herpes localizado)
- Inicio agudo de erupción cutánea en 3 o más dermatomas contiguos, más de 20 lesiones fuera del dermatoma inicial afectado o afectación sistémica (herpes diseminado)

Criterio de laboratorio

Al menos uno de los siguientes :

- Aislamiento del VVZ en cultivos de líneas celulares
- Detección de ADN del VVZ mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- Detección de antígeno viral por Inmunofluorescencia directa (IFD), utilizando anticuerpos monoclonales específicos

Los métodos serológicos tienen una utilidad muy limitada para confirmar el HZ. Los ensayos de avidez de IgG permiten distinguir la infección primaria (baja avidez de IgG) de una reactivación/reinfección (alta avidez de IgG).

Criterio epidemiológico

No procede

Clasificación de los casos

Caso sospechoso: persona que presenta el **criterio clínico**.

Caso probable: no procede.

Caso confirmado: persona que presenta el **criterio clínico** y el de **laboratorio**.

Definición de brote: no procede.