



TRIQUINOSIS

Definición de caso

Criterio clínico	Al menos tres de las siguientes manifestaciones: – Fiebre – Mialgias – Diarrea – Edema facial – Eosinofilia – Hemorragias subconjuntivales, subungueales y retinianas
Criterio de laboratorio	Al menos uno de los siguientes: – Confirmación de larvas de <i>Trichinella</i> spp. en el tejido muscular obtenido por biopsia – Respuesta específica de anticuerpos frente a <i>Trichinella</i> spp. (IFA, ELISA o inmunoelectrotransferencia Western Blot) La seroconversión (aparición o aumento del título de anticuerpos en un segundo suero obtenido al menos 15 días (2 semanas) después de la fecha de toma de muestra del primer análisis serológico) confirma el diagnóstico. Ante una única determinación serológica, un resultado positivo, por ELISA o IFA, en ausencia de criterios clínicos o epidemiológicos, requerirá de su confirmación mediante una técnica serológica más específica (Western Blot)
Criterio epidemiológico	Al menos una de las relaciones epidemiológicas siguientes: – Exposición a una fuente común – Exposición a carne contaminada

Clasificación de los casos

- **Caso sospechoso:** no procede.
- **Caso probable:** persona que presenta el **criterio clínico** y el **epidemiológico**.
- **Caso confirmado:** persona que presenta el **criterio de laboratorio**.

Definición de brote

Dos o más casos de triquinelosis que tengan relación epidemiológica.